

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Syndrome de l'intestin irritable

Objectifs pédagogiques:

- Savoir définir le SII
- Poser le diagnostic positif et différentiel
- Connaitre la stratégie thérapeutique

Dr K.Layaida


Service de gastro-entérologie

CHU Mustapha

Introduction

- Motif de consultation le plus fréquent
- Prévalence: variable en fonction des critères de définition $\approx 10\%$
- Sexe ratio: 2F/1H
- Cout ↗:
 - Direct: consultations, ex. complémentaires, médicaments
 - Indirect: arrêt de travail, présentéisme perturbé

Epidémiologie



25 à 50% de consultations en gastro-entérologie

Définition

Association d'une douleur/inconfort de l'abdomen associé à des troubles du transit intestinal pendant des périodes \pm longues, récurrentes

Plusieurs critères diagnostiques cliniques: Diagnostic +

- Manning : 1978
- Rome I : 1992
- Rome II : 1999
- Rome III : 2005 (publié 2006)

Définition

Critères Rome III

Douleur abdominale ou inconfort digestif (sensation abdominale désagréable non douloureuse) survenant au moins 3 jours par mois durant les trois derniers mois associés avec au moins 2 des critères suivants:

- Amélioration par la défécation
- Survenue associée à une modification de la fréquence des selles
- Survenue associée à une modification de la consistance des selles

Les sous groupes se définissent en fonction de la consistance des selles selon l'échelle de Bristol

Consistance des selles selon l'échelle de Bristol

	Type 1	Selles dures en forme de billes détachées (selles difficiles)
	Type 2	Selles en forme de billes collées
	Type 3	Selles en forme de boudin, structure friable
	Type 4	Selles en forme de boudin, structure douce et lisse
	Type 5	Selles molles avec contours clairement tranchés (selles faciles)
	Type 6	Selles molles à très molles aux contours imprécis
Liquide	Type 7	Selles aqueuses sans structure (totalement liquide)

Gut 1992;33:818-24

Sous groupes en fonction de la consistance des selles

-SII avec constipation prédominante (C-SII):

Bristol 1-2 \geq 25% du temps, Bristol 6-7 \leq 25% du temps.



-SII avec diarrhée prédominante (D-SII):

Bristol 6-7 \geq 25% du temps, Bristol 1-2 \leq 25% du temps.



-SII avec alternance diarrhée-constipation (M-SII):

Bristol 1-2 \geq 25% du temps, Bristol 6-7 \geq 25% du temps.

-SII non spécifié:

Absence de critères suffisants pour être classé parmi les 3 formes précédentes

Stratégie diagnostique

Diagnostic positif



Critères diagnostiques cliniques



Examens complémentaires ↘



Cout ↘

Diagnostic d'exclusion



Examens complémentaires



Éliminer une pathologie organique



Cout ↗



Risque de méconnaître une pathologie organique: cancer du colon++?

Interrogatoire +++ Méthodique

- Type et ancienneté des symptômes: Sd Koenig
- Signes d'alarme
- Antécédents personnels et familiaux: cancers digestifs+++
- Prises médicamenteuses antérieures (antispasmodiques, modificateurs du transit, antidépresseurs)
- Traitements associés à une autre pathologie
- Facteurs psycho-sociaux: traits de personnalité anxieuse, dépressive, hypochondriaque +++

Interrogatoire

Examen clinique

- Manifestations extra-digestives^{**}: fatigue chronique, céphalées, lombalgies chroniques, symptômes urinaires, dyspareunie, fibromyalgie
 forme sévère
- Examen clinique: méthodique et complet
pauvre (douleur du cadre colique)
- Troubles dyspeptiques^{*}: ≈20% passage
SII  Dyspepsie

^{*}Gastroenterology 1995; 109:671-80

^{**}Gastroenterology 2002; 122: 1140-56


Signes d'alarme

- Présence de sang mêlé aux selles +
- Antécédents familiaux de cancer colique +
- Anomalie de l'examen clinique +
- Amaigrissement
- Symptômes nocturnes
- Anorexie

Diagnostic positif de SII

- Sujet jeune: âge < 50 ans
- Troubles anciens sans aggravation ou modification récente des symptômes
- Absence de signes d'alarme
- Antécédents familiaux négatifs: cancer digestif++, MICI, maladie cœliaque
- Bilan morphologique < 5 ans négatif

Pas d'examens complémentaires



Traitement d'épreuve



Diagnostic d'exclusion du SII

- Age > 50 ans
- Présence de signes d'alarme
- SII avec diarrhée prédominante



Examens complémentaires




Lesquels ?

Examens complémentaires


- Bilan biologique: NFS, Sd inflammatoire (VS, CRP)
faible rendement diagnostique
- Recherche d'une dysthroïdie: TSHus
- Parasitologie des selles: le plus souvent -, rarement + Blastocystis hominis sans conséquence sur le plan clinique
- Echographie abdominale: attention aux erreurs d'interprétation
- EOGD: Dépistage de la maladie cœliaque (Bx duodénales)
- Coloscopie: CCR, MICI...
- Intolérance au lactose: test respiratoire « Breath test »

Coloscopie


ADK colon




RCH



Crohn iléal



Maladie cœliaque






Désolé docteur, mais je dois encore vous contredire !



Buts du traitement

Soulagement de la douleur : objectif principal +++
Correction /des troubles du transit et du ballonnement abdominal




Amélioration de la qualité de vie

Effet placebo ↑↑↑



Relation médecin-malade +++

Bases physiopathologiques



Règles hygiéno-diététiques

- Patients très attentifs aux conseils diététiques
- Lien chronologique entre la prise alimentaire et l'apparition ou l'aggravation des symptômes

Exclusion alimentaire: attention, pas d'exclusion systématique (listes d'aliments autorisés et interdits?)

Uniquement si relation claire reproductible entre ingestion de certains aliments et la survenue des symptômes

Herboriste: mélange de plantes médicinales
Efficacité thérapeutique et innocuité à démontrer


Enrichissement du régime avec des fibres alimentaires

Conseils habituels

- Fibres insolubles: grains entiers, son de blé.....
- Fibres solubles: fruits à pépins(pommes, poires, raisin...)

- 20 essais 1966-2002
- Efficacité globale et sur la douleur: NS
- Fibres insolubles: aggravation inconfort / ballonnement abdominal

Bénéficiaire potentiel: SII-C ++



Antispasmodiques


Largement prescrits en première intention

Troubles moteurs: anomalies des contractions (amplitude, propagation), réponse motrice recto-sigmoïdienne excessive



Efficacité démontrée sur plusieurs méta-analyses sur la douleur mais pas sur le trouble du transit intestinal

Douleur abdominale déclenchée par les repas +++



Antispasmodiques

- Trimébutine: Débridat
 - Pinaverium: Dicétel
 - Mébévérine: Duspatalin
 - Association Alvéline-siméthicone: Météospasmyl
 - Phloroglucinol: Spasfon
- action rapide → à la demande: douleurs abd. paroxystiques

Traitement continu vs traitement des poussées


Montmorillonite beidellitique

Bébélis

- Argille naturelle
- SII-C: amélioration de la douleur abdominale et le confort digestif de façon significativement supérieure au placebo
- Effet moins net dans les sous groupes SII-D et SII-C/D


Ducrotté et al. APT 2005;21: 435-444

Antidépresseurs




Action sur la douleur
Mécanisme d'action incertain

Psychiatry Neurosci 2001



Antidépresseurs

- Action sur l'humeur non nécessaire
- Utilisés à des doses plus faibles / dépression
- Bénéfice thérapeutique > 2 semaines de traitement
- Compliance du malade est la clé du succès thérapeutique
- Doses progressivement croissantes  limiter les effets II

- Tricycliques+++
- Dose initiale réduite puis ↗ par paliers 4/5 jours
- Prise vespérale
- Dose 30-50 mg/j voire moins 10 mg/j
- Echec si inefficacité 1-3 mois
- Si succès, diminuer la dose après 6 mois

Indication de choix: SII modéré à sévère notamment avec diarrhée

Médicaments agissant sur les récepteurs de la sérotonine

Sérotonine = médiateur clé de la sensibilité viscérale et de la motricité digestive

Antagonistes 5-HT₃

Bloquent la transmission du message sensitif et ralentissent le transit

Indication: SSI-D

EII: constipation, colite ischémique?

Alosetron(US)
Cilansetron(retiré)
Ramosetron

Agonistes 5-HT₄

Accélèrent le transit oro-caecal

Indication: SSI-C

Accidents cardiovasculaires?

Tégaserod
Prucaloprid..

Médicaments agissant sur l'écosystème intestinal

Antibiotiques



Pullulation microbienne?
Rôle de la flore bactérienne anormale?



Métronidazole
Néomycine

Probiotiques



Microorganismes (bactéries, levures) exercent un effet bénéfique après leur ingestion




Restauration de la balance cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires?

Effet sur le ballonnement abdominal +
Autre: à préciser

Régulateurs du transit intestinal

- Constipation:
 - RHD
 - Laxatifs osmotiques ++(Forlax, Duphalac..)
 - Mucilages (Normacol, Kaologeais...)
 - Attention aux laxatifs irritants
- Diarrhée: lopéramide +++

Algorithme



Futurs médicaments?

- **PLUSIEURS COMPOSES SONT EN COURS D' INVESTIGATION**

Antagonistes CCK-A

Antagonistes Neurokinine 1 and 3

Antagonistes K opioïdes

Agonistes α_2 adrénergique

Antagonistes M3

Antagonistes Cannabinoïdes CB1

Antagonistes CRF1

Dernier recours



Conclusion

- SII = pathologie fréquente encore mal définie
- Présentations cliniques polymorphes
- Mécanismes physiopathologiques complexes
approche thérapeutique rationnelle difficile
- Symptômes cliniques chroniques: suivi et médicaments au long cours
- Mesure de l'efficacité thérapeutique difficile: effet placebo ↑
- Approche thérapeutique basée sur un diagnostic fiable et une bonne relation médecin-malade
- Eviter les erreurs de prescription: régime++, multiplication des médicaments, des explorations....

Merci

